

Literaturangaben: (Studien zu Glutathion & Anthocyanen)

- 1.The role of glutathione in combination with cisplatin in the treatment of ovarian cancer, Tedeschi, M.; De Cesare, A.; Oriania, S.; Perego, P.; Silva, A.; Venturino, P.; Zunino, F.; Cancer Treatment Reviews (1991) 18, 253-259
- 2.Reduced Glutathione Protects against Cisplatin-induced Neurotoxicity in Rats, Hamers, F.P.T.; Brakkee, J.H.; Cavalletti, E.; Tedeschi, M.; Marmonti, L.; Pezzoni, G.; Neijt, J.P.; Gipsen, W.H.; Cancer Research 53, 544-549, February 1, (1993)
- 3.Protective effect of reduced glutathione against cisplatin induced renal and systemic toxicity and its influence on the therapeutic activity of antitumor drug, Zunino, F.; Pratesi, G.; Micheloni, A.; Cavalletti, E.; Sala, F.; Tofanetti, O.; Chem.-Biol. Interactions, 70 (1989) 89-101, Elsevier Scientific Publishers Ireland Ltd.
- 4.Prevention of cyclophosphamide-induced urotoxicity by reduced glutathione and its effect on acute toxicity and antitumor activity of the alkylating agent, Tofanetti, O.; Cavalletti, E.; Besati, A.; Pratesi, G.; Pezzoni, G.; Zunino, F.; Cancer Chemother. Pharmacol. (1985) 14: 188-193
- 5.Prevention of Doxorubicin Myocardial Toxicity in Mice by Reduced Glutathione, Yoda, Y.; Nakazawa, M.; Abe, T.; Kawakami, Z.; Cancer Research 46, 2551-2556, May (1986)
- 6.Influence of glutathione administration on the disposition of free and total platinum in patients after administration of cisplatin, Leone, R.; Fracasso, M.E.; Soresi, E.; Cimino, G.; Tedeschi, M.; Castoldi, D.; Monzani, V.; Colombi, L.; Usari, T.; Bernareggi, A.; Cancer Chemother. Pharmacol. (1992) 29: 385-390
- 7.Phase I Trial of Cisplatin in Combination with Glutathion, Plaxe, St.; Freddo, J.; Kim, S.; Kirmani, S.; McClay, E.; Christen, R.; Braly, P.; Howell, St.; Gynecology Oncology 55, 82-86 (1994)
- 8.Weekly 5-fluorouracil and folinic acid plus escalating doses of cisplatin with glutathione protection in patients with advanced head and neck cancer, Gebbia, V.; Valenza, R.; Testa, A.; Zerillo, G.; Restivo, S.; Cupido, G.; Ingria, F.; Spadafora, F.; Barbaccia, C.; Cannata, G.; Cipolla, C.; Gebbia, N.; Med. Oncol. & Pharmacother. Vol. 9 No. 4 pp. 165-168, (1992)
- 9.A phase II study of combination chemotherapy in advanced ovarian carcinoma with cisplatin and cyclophosphamide plus reduced glutathione as potential protective agent against cisplatin toxicity, Locatelli, M.C.; D'Antona, A.; Labianca, R.; Vinci, M.; Tedeschi, M.; Carcione, R.; Corbo, A.; Venturino, P.; Luporini, G.; Tumori, 79: 37-39 (1993)
- 10.Efficacy and safety of high-dose cisplatin and cyclophosphamide with glutathione protection in the treatment of bulky advanced epithelial ovarian cancer, Di Re, F.; Bohm, S.; Oriana, S.; Spatti, G.B.; Zunino, F.; Cancer Chemother. Pharmacol. (1990) 25: 355-360
- 11.A preliminary clinical study of cyclophosphamide with reduced glutathione as uroprotector, Nobile, M.T.; Vidili, M.G.; Benasso, M.; Venturini, M.; Tedeschi, M.; Zunino, F.; Rosso, R.; Tumori, 75: 257-258, (1989)
- 12.glutathione and S-acetylglutathione as selective apoptosis-inducing agents in cancer therapy, Donnerstag, B.; Ohlenschläger, G.; Cinatl, J.; Amrani, M.; Hofmann, D.; Flindt, S.; Treusch, G.; Träger, L.; Elsevier, Cancer Letters 110 (1996) 63-70
- 13.Glutathione augments the activation of cytotoxic T-lymphocytes in vivo, Dröge, W.; Pottmeyer-Gerber, Ch.; Schmidt, H.; Nick, S.; Immunobiol., Vol.172, pp. 151-156 (1986)
- 14.Studie über die Wirkung von GSH, L-Cystein und Anthocyanen (Glutacyan®) bei metastatischem kolorektalem Karzinom mit relativer Mangelernährung, Garcia-Giral, E.; Perdereau, B.; Brixy, F.; Rhlouch, H.; Treusch, G.; Ohlenschläger, G.; Poullart, P.; Seventh International Congress on Anti-Cancer Treatment, 3-6.02.1997
- 15.Attestation, Perdereau, B.; Institut Curie, Section médicale et hospitalière, 5.7.1999
- 16.Refreshment effect of reduced glutathione, anthocyanins and L-cystein on lymphocyte subsets and prevention of respiratory infections in chernobyl children, Chernyshov, V.; Omelchenko, L.; Treusch, G.; Vodyanik, M.; Vykhovalnets, E.; Pochinok, T.; Institut of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Academy of Medical Sciences, Kiev; 5th International Conference on the Prevention of Infection, May 6th-7th 1998 Acropolis Nice (France)
- 17.Disorders in mononuclear phagocytes and reduced glutathione and their correction in Chernobyl children with recurrent respiratory infections and chronic inflammatory focal lesions, Chernyshov, V.P.; Omelchenko, L.I.; Treusch, G.; Vodyanik, M.A.; Pochinok, T.V.; Zelinsky, G.M.; Gumenyuk, M.V.; Institut of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Academy of Medical Sciences, Kiev; Elsevier, Immunology Letters, Vol. 73, No. 2,3 73 75-302, Abstract No. 523, Abstracts of the 14th European Immunology Meeting EFIS 2000, 23.-27.09.2000
- 18.Immunological analysis of reduced glutathione, L-cystein and Anthocyan effects in Chernobyl children with recurrent respiratory infections and chronic inflammatory focal lesions, Chernyshov, V.P.; Omelchenko, L.I.; Treusch, G.; Vodyanik, M.A.; Pochinok, T.V.; Zelinsky, G.M.; Gumenyuk, M.V.; Institut of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Academy of Medical Sciences, Kiev; Central European Journal of Immunology, Vol. 25, 3-2000
- 19.Glutathion treatment of hepatocellular carcinoma, Dalhoff, K.; Ranek, L.; Mantoni, M.; Poulsen, H.E.; University of Copenhagen; Liver 1992: 12: 341-343, Munksgaard (1992)
- 20.Redox Recycling between Glutathione and Anthocyanins in Vitro, Ohlenschläger, G.; Treusch, G.;
- 21.Suppression of Tumor Cell Growth by Anthocyanins in Vitro, Kamei, H.; Kojima, T.; Hasegawa, M.; Koide, T.; Umeda, T.; Yukawa, T.; Terabe, K.; Cancer Investigation, 13(6), 590-594 (1995), Marcel Dekker, Inc.
- 22.Flavonoide-Mediated Tumor Growth Suppression Demonstrated by in vivo Study, Kamei, H.; Tatsuro, K.; Kojimam, T.; Hasegawa, M.; Umeda, T.; Terabe, K.; Hashimoto, Y.; Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals, Vol. 11, No. 3 (1996) Mary Ann Liebert, Inc.
- 23.Reduced glutathione and anthocyanins Redox-cycling and redox-recycling in biological systems, Ohlenschläger, G.; Treusch, G.; Praxis-Telegramm, Special Edition, Supplement to issue No. 6/94, December 1994, Ralf Reglin Verlag, Köln
- 24.Lexikon der Biochemie und Molekularbiologie; Herder Verlag, Band 2, 1992



Magensaftresistent!

INNEX cell protect
Kombination von G-SH, L-Cystein,
& spezifischen Anthocyanen
**Auf Grundlage der Rezeptur nach
Prof. Treusch / Dr. Ohlenschläger**

INNEX cell protect ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Bitte trocken, lichtgeschützt, nicht über 25°C und ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Während der Schwangerschaft- und Stillzeiten sollte generell vor dem Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln der Arzt konsultiert werden.

INNEX cell protect ist erhältlich in Ihrer Apotheke oder zu bestellen.

per Fax: 06336-4389658
Info-Hotline: 06336-4389657

PZN: 13923166 (200 Kapseln+200 Tabl.)
13923172 (90 Kapseln+90 Tabl.)



Vertreiber:
INNEX Pharma
Inh. Marcus Zwally
Hubstr. 22 * 66503 Dellfeld
GERMANY

Nahrungsergänzungsmittel

Frei von künstlichen & tierischen Zusatzstoffen

vegan



cell protect

**VERBESSERTE ORIGINAL REZEPTUR
NACH PROF. G. TREUSCH**

Zur gezielten Versorgung mit reduziertem
Glutathion (G-SH), L-Cystein und
spezifischen Anthocyanen

Nach aktuellstem Erkenntnis- und Wissensstand

Inhalt: 200 Kapseln + 200 Tabletten (rot)
oder
90 Kapseln + 90 Tabletten (rot)

Diese Information wurde von und für Menschen, die beruflich mit Gesundheit und Ernährung beschäftigt sind, geschrieben. Sie ist nicht konzipiert oder gedacht für Laien / Verbraucher. Die Diagnose und Behandlung von Krankheiten müssen unter der Verantwortung einer lizenzierten medizinischen Fachkraft durchgeführt werden.

INNEX cell protect auf Grundlage einer Rezeptur nach Prof. Treusch und Dr. Ohlenschläger

Redoxrecycling* der Kombination reduziertem Glutathion & Anthocyanen

*Reduced glutathione and anthocyanins Redox-cycling and redox-recycling in biological systems, Ohlenschläger, G.; Treusch, G.; Praxis-Telegramm, Special Edition, Supplement to issue No. 6/94, December 1994, Ralf Reglin Verlag, Köln

Zusammensetzung:

Hauptinhaltsstoffe:

1 Kapsel enthält:

Glutathion red. (G-SH)* 200 mg
L-Cystein 40 mg

(*Sehr hochwertiges reduziertes Glutathion mit besonders hoher Bioverfügbarkeit)

1 Tablette (rot) enthält:

Spezifisches Anthocyankonzentrat 50 mg

Reduziertes Glutathion

Glutathion ist ein Antioxidans, bestehend aus drei Aminosäuren (*Glutaminsäure, Cystein und Glycin*). Es entgiftet, stärkt das Immunsystem und kann andere Antioxidantien regenerieren. Die Entfaltung der antioxidativen Eigenschaften von Glutathion ist dabei nicht folgenlos. Mit dem Fang **freier Radikale** oxidiert das aktive Tripeptid reduziertes Glutathion (GSH) und wird durch die Verbindung zweier Moleküle zum unwirksamen Glutathion-Disulfid (GSSG). Damit aus dem oxidierten GSSG wieder die wirksame Antioxidans GSH reduziert werden kann, benötigt es **spezifische Anthocyane** (*Redox-Recycling*).

NEU: Glutathion geht direkt in die Zellen!

Dies belegt eine neue Studie am Penn State College of Medicine, Pennsylvania. Eine randomisierte, Placebo-kontrollierte Doppelblind-Studie wies eine 30 bis 35% Steigerung des Glutathionspiegels unter anderem in den Blutzellen, Lymphozyten und dem Plasma auf.

Frei von künstlichen & tierischen Zusatzstoffen

vegan




Zur gezielten Versorgung mit reduziertem Glutathion (G-SH), L-Cystein, Anthocyanen

Inhalt:

200 Kapseln (weiß):

reduziertes Glutathion, L-Cystein
magensaftresistent!

200 Tabletten (rot): spezifische Anthocyane



* Quelle Grafik: Prof. G. Treusch

100% VEGAN
Ohne Gentechnik
Keine Tierversuche
Ohne Gluten
Laktosefrei

Dosierbeispiel

Das nachfolgend aufgezeigte Dosierschema soll nur als Hinweis für einen ggf. behandelnden Arzt gelten, der nach seinem eigenem Ermessen die Dosierung bestimmen kann.

Beispiel für die Einnahme

morgens		ERWACHSENE
abends		1. Phase: (Dauer 14 Tage) 2.000 mg red. Glutathion - täglich 500 mg Anthocyane* - täglich
morgens		ERWACHSENE
abends		2. Phase: (Dauer 6 Wochen) 1.600 mg red. Glutathion - täglich 400 mg Anthocyane* - täglich
morgens		ERWACHSENE
abends		3. Phase: (Dauer 4 Wochen) 1.200 mg red. Glutathion - täglich 300 mg Anthocyane* - täglich

Die Einnahme von **INNEX cell protect** wird auf nüchternen Magen jeweils 2 Stunden von einer Mahlzeit entfernt eingenommen. Die Kapseln (G-SH, L-Cystein) und die roten Tabletten (spezifische Anthocyane) sollen gemeinsam eingenommen werden. Die Einnahme kann auf zwei bis dreimal über den Tag verteilt erfolgen, z.B.: 2 Stunden vor dem Frühstück 3 Kapseln + 3 rote Tabletten. und kurz vorm Schlafengehen 3 Kapseln + rote Tabletten.

INNEX cell protect sollte nicht unmittelbar zusammen mit Elektrolyten, Mineralien und/oder Spurenelementen (wie z.B. Magnesium, Calcium, Zink, Eisen, Kupfer, Mangan, eingenommen werden, da Glutathion in der Lage ist Schwermetalle zu chelatieren.

Bei einer Einnahme von **INNEX cell protect**, die in hoher Einzel- und Tagesdosierung 4-6 Wochen überschreitet, sollte der Serum-Zink-Spiegel untersucht werden. Ist dieser erniedrigt, dann sollten auch andere lebenswichtige Elektrolyte und Spurenelemente quantitativ im Serum bestimmt werden und nötigenfalls substituiert werden.

PZN: 13923166 (200 Kapseln+200 Tabl.)
 13923172 (90 Kapseln+90 Tabl.)

